

Российская академия наук
Уральское отделение
Институт экологии растений и животных
Уральское орнитологическое общество

МАТЕРИАЛЫ
К РАСПРОСТРАНЕНИЮ

П Т И Ц

НА УРАЛЕ, В ПРИУРАЛЬЕ
И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Выпуск 15

Екатеринбург
Издательство Уральского университета
2010

УДК 598.2:591

М 341

*Сборник издан на средства Программы
Президиума Российской академии наук № 23
«Биологическое разнообразие»
и на взносы авторов сообщений*

Ответственные редакторы:

доктор биологических наук

В. К. Рябицев,

кандидат биологических наук

В. В. Тарасов

Материалы к распространению птиц на Урале, в Приуралье и
М 341 Западной Сибири : [сб. ст. и крат. сообщ. / отв. ред. В. К. Рябицев,
В. В. Тарасов]. Вып. 15. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,
2009. — 206 с.

ISSN 2218–7685

Пятнадцатый выпуск сообщений с новыми данными о местах гнездования, зимовки, путях миграций и залетах птиц, статьи с полным обзором орнитофауны отдельных территорий.

Сборник предназначен для орнитологов, биогеографов, преподавателей биологических факультетов, любителей птиц.

УДК 598.2:591

ISSN 2218–7685

© Институт экологии растений
и животных УрО РАН, 2010

© Рябицев В. К., обложка, 2010

крыльев — 186 мм, длина клюва до ноздри — 8,8 мм. Длина первого пальца — 7,8 мм, первого когтя — 6,7 мм.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Валуев В. А. Новые данные по авифауне лесостепных районов Предуралья Башкортостана // Итоги биологических исследований 2001 г. : сб. науч. тр. Уфа, 2003. Вып. 7. С. 51–53.
- Валуев В. А. Экология птиц Башкортостана (1811–2008). Уфа, 2008. 712 с.
- Герке А. А. К биоценологии синичьих стай // Зоол. журн. 1932. Т. 11, вып. 3–4. С. 90–123.
- Захаров В. Д. Птицы Южного Урала (видовой состав, распространение, численность). Екатеринбург ; Миасс, 2006. 228 с.
- Ильичев В. Д., Фомин В. Е. Орнитофауна и изменение среды (на примере Южно-Уральского региона). М., 1988. 247 с.
- Кириков С. В. Птицы и млекопитающие в условиях ландшафтов южной оконечности Урала. М., 1952. 412 с.
- Птушенко Е. С. Славковые // Птицы Советского Союза. М., 1954. С. 146–330.
- Рябицев В. К. Птицы Урала, Приуралья и Западной Сибири : справочник-определитель. Екатеринбург, 2002. 608 с.

ГНЕЗДОВАНИЕ ВЯХИРЯ В НАСЕЛЕННОМ ПУНКТЕ

М. С. Галишева

Городской детский экологический центр,
ул. Карла Либкнехта, 44г, г. Екатеринбург; galishev@mail.ru

Поступила в редакцию 27 сентября 2010 г.

На территории Урала **вяхирь** *Columba palumbus* является обычным лесным видом, практически не вовлеченным в процесс урбанизации. Однако в странах Западной Европы, где численность его намного выше, он давно уже стал городской птицей. В последние годы вяхирь, помимо активного продвижения на север и восток, приступил к освоению антропогенного ландшафта в удаленных от центра частях ареала. Случай удачного гнездования пары вяхирей зафиксирован в 2009 г. на территории крупного села Колчедан (население 5 тыс. человек) Каменского р-на Свердловской области.

С 10 мая 2009 г. голос вяхиря регулярно был слышен с кладбища, расположенного на территории села. Позже пару вяхирей отметили

во дворе одного из частных домов. Они 2–3 дня безуспешно пытались построить гнездо на растущем во дворе вязе, на высоте 7 м. Голуби бродили по огороду, собирали веточки, периодически сидели на земле под деревом, прижавшись друг к другу, не особенно опасаясь людей. В итоге гнездо было построено на том же вязе, но на высоте 12 м, и впервые обнаружено 14 июня на стадии насиживания яиц. Оно было расположено на боковой извилистой ветке и хорошо замаскировано. В конце июня, когда в гнезде уже были птенцы, наблюдали попытку кошки подобраться к гнезду. Взрослая птица, защищая птенцов, привлекла громкими тревожными криками людей, и они прогнали кошку.

14 июля 2 взрослых птенца сидели на ветках вяза. Еще около 2 недель они оставались на дереве, медленно перемещаясь в кроне. Взрослые кормили их, что было хорошо видно. В конце июля жители дома наблюдали, как 3 птицы взлетели с дерева и направились в сторону леса.

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ОБЫКНОВЕННОГО КОЗОДОЯ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

А. А. Емцев

Сургутский государственный университет, кафедра зоологии,
ул. Энергетиков, 22, г. Сургут, ХМАО–Югра, 628408; alemts@mail.ru

Поступила в редакцию 5 сентября 2010 г.

В 2009 г. в 4 км к северо-востоку от д. Сайгатина (61°16' с. ш., 72°54' в. д.), в сосняке с вырубкой у верхового болота было обнаружено не менее 3 пар **козодоев** *Caprimulgus europaeus* (Емцев, 2009). При посещении этого участка 22 июня 2010 г. мною также отмечены несколько пар козодоев, демонстрировавших такое же поведение, как и год назад. Со слов преподавателя Сургутского государственного университета К. А. Берникова и студентки А. В. Чекой, пение козодоев они слышали здесь в конце июня и в середине июля. По-видимому, птицы занимают рассматриваемую территорию ежегодно. Согласно современным представлениям, северная граница ареала вида располагается несколько южнее (Птицы России..., 2005; Рябицев, 2008). В окрестностях г. Лянтор и д. Русскинская обыкновенные козодои нами не регистрировались.